

Advies beschermende producten na prostaatoperatie

Absorberende verbanden



Er bestaat een uitgebreid gamma van incoverbanden.

De absorptiegraad wordt weergegeven door middel van aantal druppels of level 0, 1, 2,

Link naar adviespagina

<https://www.continenceproductadvisor.org/>

Lees meer: document absorptiegraden incontinentieverbandenverbanden

Absorberend ondergoed



Bij licht urineverlies (tot een 100ml/4u) kan je ook gebruik maken van wasbaar ondergoed

Vraag naar korting:

- Solidarus/ Bond Moyson: 10% korting
- OZ: 40% korting
- CM: 10% korting als lid en 40% als je een medisch attest incontinentie kan voorleggen.

Verkrijgbaar bij:

<https://www.entusia.be>

<https://www.charco.be>

<https://www.hospidex.eu/be-nl/onze-merken/penosa>

<https://www.underwunder.nl>

zorgwinkels van de mutualiteit

Penisklem



Is er enkel verlies tijdens bepaalde activiteiten vb tennis, golf, zwemmen, enkele uren naar de markt of een feest.... Dan een penisklem een hulpmiddel zijn .

Deze penisklem mag maximaal 4 uur aan één stuk gedragen worden.. Belangrijk is wel dat er een goede handfunctie en een normaal gevoel in de penis is.



Bespreek met de arts wanneer er gestart mag worden met het dragen van een penisklem postoperatief.

Verkrijgbaar bij:

[PACEY CUFF Turbo Penisklem – FuturMedi](#)



<https://www.pelvishop.nl/penisklem.html>

[Cunningham penisklem \(mediq.nl\)](#)

[Prosecca® – Memidis \(memidis-shop.nl\)](#)

[thuiszorgwinkel](#)

...

Condoomkatheter



Een condoomkatheter wordt de eerste 6 maanden afgeraden.

De bekkenbodemoefeningen zijn de eerste lijn in de behandeling.